

5-HIAA (24u-urine collectie)

Instructies:

Gedurende 3 dagen voor en tijdens de test dient patiënt geen serotonine bevattende voedingsmiddelen en geen geneesmiddelen die een werking uitoefenen via het serotonine mechanisme te gebruiken.

Dieet:

Geen tomaten, bananen, walnoten, ananas, avocado's, (gedroogde) pruimen, kiwi's, aubergines, koffie, chocolade, meloenen, aalbessen, ...

Geneesmiddelen:

Geen acetaminofeen /paracetamol (Dafalgan, Panadol, Perdolan, Sinutab), fluoro-uracil (Fluracedyl, Fluroblastine), IMAO (Nardelzine), isoniazide (Nicotibine), fenothiazinen (Dominal, Nizinan), geneesmiddelen tegen hoest, fenacetine, spierontspanners, jodiumoplossingen

Alle medicatie die niet gestopt kan worden moet gemeld worden.

v.1.2 van 16/07/2020



AZ Glorieux - Laboratorium

5-HIAA (collection d'urines de 24h)

Instructions:

Durant les 3 jours précédant le test et durant toute la durée de ce test, le patient doit suivre un régime alimentaire pauvre en sérotonine et ne plus faire usage de médicaments dont le principe actif agit via la sérotonine.

Régime:

Plus de tomates, bananes, noix, ananas, avocats, prunes, pruneaux, kiwis, aubergines, café, chocolat, melons, groseilles, ...

Médicaments:

Plus d'acétaminophène/paracétamol (Dafalgan, Panadol, Perdolan, Sinutab), fluoro-uracil (Fluracedyl, Fluroblastine), IMAO (Nardelzine), isoniazide (Nicotibine), phénothiazinen (Dominal, Nizinan), médicaments contre la toux, phénacetine, relaxants musculaires, solutions d'iode.

Toute médication ne pouvant être interrompue doit être signalée.

v.1.2 du 16/07/2020



CH Glorieux - Laboratoire